



COMUNE DI PASTRENGO

Provincia di Verona

Prot. 6012
Pastrengo, 23/08/2018

AVVISO ALLA CITTADINANZA Virus Nile Disease

IL SINDACO


al fine di rendere edotta la cittadinanza del reale stato del Virus Nile Disease sul Territorio comunale e delle misure che si stanno attuando per fronteggiare la problematica nonché al fine di permettere a tutti di adottare idonee precauzioni

INFORMA

- che la maggioranza dei casi umani affetti dal virus riscontrati nel veronese, come indicato nelle comunicazioni Aulss, riguardano cittadini residenti nella parte Sud della Provincia di Verona;
- che il Comune di Pastrengo con determinazione n. 203 del 27/06/2018 ha provveduto ad affidare il servizio di disinfestazione zanzare sul territorio a ditta specializzata. Sono stati previsti n. 4 interventi antilarvali nelle caditoie, di cui tre programmati durante il corrente anno con il seguente calendario: 12 luglio – 24 agosto – 20 settembre.
- che il Comune ha risposto alle note trasmesse dall'Aulss circa le misure adottate sul territorio;

PREMESSO QUANTO SOPRA INVITA

A leggere la nota allegata predisposta direttamente dall'Aulss relativa alla trasmissione ed alle misure di prevenzione che si possono facilmente adottare per evitare il diffondersi del virus Nile Disease .

IL SINDACO
Dott. Gianni testi


**ULSS9**
SCALIGERA

Malattia da virus West Nile: trasmissione e prevenzione

Il Virus West Nile (WNV) si trasmette principalmente tramite la puntura di zanzare infette del genere *Culex*, sia agli animali che all'uomo, sebbene sia possibile anche la trasmissione tramite la donazione di sangue e tessuti infetti.

Il virus si mantiene nell'ambiente attraverso il continuo passaggio tra gli insetti ematofagi e gli uccelli che rappresentano il *reservoir* d'infezione. Può infettare diverse specie di vertebrati e tra i mammiferi l'uomo ed il cavallo, che possono manifestare sintomatologia clinica.

Non è possibile il passaggio dell'infezione da uomo a uomo.

Nel caso di puntura da parte di zanzare infette alcuni soggetti possono andare incontro ad infezione da West Nile. L'infezione decorre, in circa l'80% dei casi, in modo del tutto asintomatico, mentre in circa il 20% possono comparire (entro un periodo che varia da 3 a 7 gg), sintomi quali: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Tale quadro generalmente si risolve in una settimana. In meno dell'1% dei casi la malattia si manifesta come malattia neuro-invasiva (solitamente encefalite, meningoencefalite o paralisi flaccida), ed in particolare il rischio aumenta con l'età, soprattutto in soggetti con età superiore a 60 anni.

Per ridurre il rischio di trasmissione di WNV, la misura preventiva più efficace è quella di evitare la puntura di zanzare, adottando misure di protezione individuali che impediscono e riducono al minimo, le punture di zanzara comune.

È quindi necessario:

- indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri ed accesi attirano gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo quando si è all'aperto, soprattutto dall'alba al tramonto;
- evitare l'uso di profumi e dopobarba perché attraggono le zanzare;
- impiegare prodotti repellenti sulle parti del corpo che rimangono scoperte durante l'attività all'aperto, nei casi di attività particolarmente esposte alle punture (agricoltori, giardinieri, ecc.); è comunque necessario porre particolare attenzione al loro utilizzo su donne gravide e bambini di età inferiore a 12 anni;
- alloggiare in locali con aria condizionata o con finestre dotate di zanzariere, verificando che queste siano integre e ben chiuse;
- ricorrere, in caso di presenza di zanzare all'interno dell'abitazione, all'impiego saltuario di preparati commerciali (bombolette) a base di piretro, i cui componenti si degradano rapidamente dopo che l'ambiente sia stato ben ventilato.

Sul fronte del controllo preventivo e della tempestiva segnalazione, la Regione Veneto ha da tempo avviato un piano di monitoraggio per il controllo della possibile presenza del virus nelle zanzare.

Nello stesso ambito Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Legnaro (PD) è impegnato sul fronte del monitoraggio della presenza di zanzare infette, mediante il posizionamento di trappole per gli insetti. In questo modo si è potuta rilevare la presenza di West Nile Virus in alcuni pool di zanzare catturate, site nella parte sud della provincia di Verona.

È inoltre in atto un protocollo operativo che prevede, in seguito alla segnalazione di casi umani certi, la tempestiva segnalazione ai sindaci dei comuni interessati, per permettere loro di mettere in atto le misure di contrasto necessarie per contrastare la proliferazione delle zanzare.

Sono inoltre fondamentali l'impegno e la collaborazione di tutti i cittadini, al fine di eliminare o ridurre il più possibile i focolai di replicazione delle zanzare nelle proprietà private, trattando adeguatamente o rimuovendo i bidoni od altri recipienti di raccolta dell'acqua per gli orti o simili, nonché tutte le raccolte d'acqua, anche piccole, ivi compresi i sottovasi.

PER SAPERNE DI PIÙ

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica>

<https://www.izsvenezie.it/west-nile-virus-veneto-facciamo-chiarezza/>

Azienda Ulss 9 Scaligera

sede legale **Via Valverde 42 – 37122 Verona**

tel. **[0458075511](tel:0458075511)**

Partita Iva/Codice Fiscale **[02573090236](#)**

PEC: **protocollo.aulss9@pecveneto.it**